

Số: /UBND-KN

Định Biên, ngày tháng 12 năm 2024

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG CHỐNG ĐÓI RÉT CHO ĐÀN TRÂU TẠI XÃ ĐỊNH BIÊN

PHƯƠNG ÁN, BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG

- Chuẩn bị chuồng trại: Chuồng trại đảm bảo diện tích đủ nuôi nhốt gia súc. Kiểm tra, củng cố lại nền chuồng, mái che, tường bao quanh, đảm bảo nền chuồng luôn khô ráo trong mùa đông, che chắn chuồng nuôi đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt vào làm ẩm, ướt chuồng. Dự phòng bạt, để khi rét đậm, rét hại dùng để quây chuồng nuôi.

- Chuẩn bị thức ăn: Dự trữ thức ăn cho gia súc ăn cỏ tận dụng triệt để nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp để chế biến, dự trữ thức ăn cho chúng, đặc biệt là rơm, thân, lá cây ngô, yêu cầu mỗi gia đình có một cây rơm, rạ trên cơ sở ước tính bình quân mỗi trâu một ngày phải có 5-7 kg rơm, rạ khô.

Có kế hoạch ủ chua thức ăn thô xanh, dự trữ cho trâu (bình quân 1 tấn thức ăn ủ chua trở lên/1 con) hoặc trồng cây ngô, cỏ đảm bảo diện tích khoảng 300 - 500m²/con. Người chăn nuôi có thể bổ sung thân cây chuối làm thức ăn cho trâu bằng cách thái thân cây chuối từng đốt dày khoảng 1- 2 cm, trộn với muối hoặc bột ngô, cám gạo cho trâu ăn.

- Chăm sóc, nuôi dưỡng: Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho đàn trâu để chống rét, chống bệnh dịch.

- Phòng, chống bệnh dịch: Thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm, cho 100% số trâu trong diện phải tiêm phòng định kỳ 2 lần/năm hoặc tiêm phòng bổ sung cho trâu chưa được tiêm phòng chính vụ, theo quy định. Định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, xử lý chất thải chăn nuôi để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Thực hiện tẩy giun sán cho trâu: Tẩy giun cho nghé 2 lần vào lúc 2 -3 tuần tuổi và 6 đến 7 tuần tuổi; Bệnh sán lá gan trâu định kỳ tẩy sán lá gan 1 năm từ 1 đến 2 lần vào mùa Xuân và cuối Thu. Sử dụng loại thuốc, liều dùng, cách dùng thuốc theo chỉ dẫn của thú y.

- Khi nhiệt độ trên 12°C:

Dùng bạt che chắn chuồng nuôi, đảm bảo không bị gió lùa, mưa hắt vào chuồng; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, giữ khô nền chuồng. Buổi tối đưa trâu về chuồng. Sau khi chăn thả về, ban đêm cho trâu ăn thêm 10-15kg thức ăn/con/ngày, trong đó: 7-10kg cỏ tươi xanh hoặc cỏ ủ chua hoặc thân cây chuối thái nhỏ, 2-3kg rơm, 1-2kg thức ăn tinh, cho uống nước ấm pha muối loãng (20- 30g muối/con/ngày).

Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, bố trí khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho đàn trâu có sức chống rét, bệnh dịch.

- Khi nhiệt độ dưới 12°C:

Người chăn nuôi cần thực hiện dồn trâu về chuồng, lán tạm. Tuyệt đối không thả rông tự do ngoài đồng, ngoài bãi chăn thả, trên rừng qua đêm.

Thực hiện các biện pháp chống rét cho trâu bằng cách dùng chăn, bao tải, bạt khoác cho trâu, bò, hoặc có thể dùng bóng điện, đốt than củi, trâu để sưởi ấm cho trâu.

Trên đây là phương án chống đói rét cho trâu của xã Định Biên đề nghị các trường xóm và nhân dân thực hiện./.

Nơi nhận:

- 09 Ông(bà) trưởng xóm;
- Lưu: VP,KN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ma Lăng Hiến